

KWS FIT4NEXT

KARTOFFEL

Zwischenfrucht-Mischungen, die stärken.

GREENING-
FÄHIG

KWS



Besondere Stärken

- Multiresistenter Ölrettich gegenüber Kartoffel- und Rübennematoden*
- Komponenten-Zusammensetzung optimiert auf Verträglichkeit in der Kartoffelfruchtfolge
- Beste Tiefendurchwurzelung dank Ölrettich und Lupine
- Ausbringung von Wirtschaftsdüngern im Herbst möglich**

* Gegenüber Rübennematoden (*Heterodera schachtii*), und Wurzelgallenälchen (*Meloidogyne chitwoodi*), APS 2 nach Bundessortenamt.

** Unter Berücksichtigung der Düngeverordnung in Bezug auf Vorfrucht und länderspezifischen Regelungen.

Wissenswertes

Leguminosenanteil in %: 4

Aussaatstärkeempfehlung für eine optimale Bestandesdichte*:

kg/ha: 30 - 35

Körner/m²: 170 - 200

Aussaatstärkeempfehlung zur aktiven Reduzierung von Rübennytennematoden (*Heterodera schachtii*)**:

kg/ha: 35 - 40

Körner/m²: 200 - 230

Aussaatzeitempfehlung:

Juli	August	September	Oktober
■	■	■	■


■ optimal ■ gut ■ möglich

* Die Aussaatstärkeempfehlung bezieht sich auf optimale Aussaatbedingungen bezüglich Bodenfeuchte, Saattbettbereitung und Aussaattechnik.

** Mischungen mit resistenten Senf- und Ölrettichsorten wirken ab einer Pflanzenzahl > 160/m² dieser beiden Komponenten nematodenreduzierend (*Heterodera schachtii*).

(KWS LOCHOW, 2020)

Samenanteile in % und Fruchtfolgeeignung



■ Ölerrettich, multiresistent¹⁾ ■ Leindotter ■ Rauhafer ■ Lupinen

¹⁾ Gegenüber Rübennematoden (*Heterodera schachtii*) und Wurzelgallenälchen (*Meloidogyne chitwoodi*), APS 2 nach Bundessortenamt (KWS LOCHOW, 2020)