

## Körner-Sonnenblume

- Hohe Kornerträge
- Gute Standfestigkeit
- Geringe Anfälligkeit bei Botrytis

Ertrag und Qualitä	t	
Kornertrag	hoch	7
Ölgehalt	mittel	5
Ölertrag	hoch	7
		_
Marktleistung		
Eigenschaften		
Blühbeginn	früh bis mittel	4
Reife	mittel	5
Pflanzenlänge	mittel bis lang	6
Neigung zu Lager	sehr gering bis gering	2

Anfälligkeit für		
Sclerotinia	gering	3
Botrytis	sehr gering bis gering	2
Phoma	mittel	5
	erhalten ausgeprägtes Merkmal hoch/zügig ausgeprägtes Merkmal	

Quelle: Züchtereinstufung 2023, Zugelassen seit 2016

## Herbizideinsatz:

Herbizide zur dicotylen Unkrautbekämpfung im Vorauflauf, wie z. B. mit den Wirkstoffen Aclonifen (**Bandur 4,0 I/ha**), Pendimethalin und Dimethenamid-P (**Spectrum Plus 4,0 I/ha**), sind **einsetzbar**.

**KWS ACER CL** ist **tolerant** gegenüber dem Wirkstoff **IMAZAMOX**. Unkräuter und Ausfallgetreide können im Nachauflauf von BBCH 10 bis BBCH 14 mit **Clearfield-Clentiga 1,0 I/ha + Dash 1,0 I/ha** bekämpft werden.