

Cu un pas înainte.

Cu hibridii de rapiță și soluțiile KWS.

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ

UMBERTO KWS	39
KWS SANCHOS	40
KWS MIKADOS	41
KWS SAUROS CL	42

UMBERTO KWS

Rapiță de toamnă



- Potențial de producție excepțional
- Rezistență excelentă la cădere
- Tolerant la fomoză (RLM 3 și RLM 7)
- Rezistență foarte bună la scuturare
- Rezistență înaltă la iernare
- Capacitate foarte mare de ramificare
- Adaptat la semănatul tardiv

Grupa de maturitate

Semitimpuriu

Caracteristici agronomice

- Se pretează pentru termenii de semănat medii și târzi
- Capacitate mare de ramificare
- Înălțimea plantei - medie/înaltă

Caracteristici fenologice

- Ritm de creștere în toamnă - rapid
- Ritm de creștere în primăvară - rapid
- Începutul înfloritului - timpuriu

Puncte forte



Rezistență înaltă la iernare



Înflorit timpuriu



Rezistență excelentă la cădere



Rezistență foarte bună la desfacerea și scuturarea silicvelor



Potențial de producție excepțional

Adaptat la diferite condiții de agrofon

Productivitatea și conținutul de ulei



Potențial de roadă excelent



Conținut ridicat de ulei



Conținutul în glucozinolați 17-18 mk mol/g



Ritm rapid de creștere în toamnă



Ritm rapid de creștere în primăvară



Toleranță foarte bună la fomoză RLM 3 și RLM 7

Rezistență la

Îngheț

Alternarioză

Sclerotinia

Fomoză

înaltă

înaltă

medie

înaltă (RLM 3 și RLM 7)

Recomandări

Termeni de însămânțare

Norma de semănat recomandată

începând cu decada a II a lunii august până în decada a II a lunii septembrie

400-500 mii/ha

KWS SANCHOS

Rapiță de toamnă



NOU

- Hibrid cu potențial de producție foarte ridicat
- Hibrid cu o rezistență excelentă la scuturare
- Ramificații numeroase, număr mare de silicve bogate în semințe cu mmb mare
- Are o viteză excepțională de umplere a boabelor și un MMB ridicat, care îi asigură un avantaj în atingerea performanțelor de producție

Grupa de maturitate	Puncte forte	Productivitatea și conținutul de ulei
Semitimpuriu	Rezistență înaltă la iernare	Potențial de roadă excelent
Caracteristici agronomice	Înflorit târziu	Conținut ridicat de ulei
■ Se pretează pentru termenii de semănat medii și tardivi ■ Capacitate mare de ramificare ■ Înălțimea plantei - medie/înaltă	Rezistență excelentă la cădere	Conținutul în glucosinolați 17-18 mk mol/g
Caracteristici fenologice	Rezistență excelentă la desfacerea și scuturarea silicvelor	Ritm rapid de creștere în toamnă
■ Ritm de creștere în toamnă - rapid ■ Ritm de creștere în primăvară - rapid ■ Începutul înfloritului - târziu	Potențial de producție excepțional	Ritm rapid de creștere în primăvară
	Adaptat la diferite condiții de agrofon	Toleranță foarte bună la fomoză RLM 7-3

Rezistență la			
Îngheț	TuYV	Sclerotinia	Fomoză
înaltă	medie	înaltă	înaltă RLM 7

Recomandări	
Termeni de însămânțare	Norma de semănat recomandată
începând cu decada a II a lunii august până în decada a II a lunii septembrie	400-500 mii/ha

KWS MIKADOS

Rapiță de toamnă



NOU

- Rezistență genetică la Phoma lingam asigurată de către Phoma protect 2.0 RLMs (RLM7 și RLM3)
- Plasticitate largă și potențial de producție ridicat
- Toleranță foarte bună la Pyrenopeziza brassicae, responsabilă de pătarea frunzelor

Grupa de maturitate	Puncte forte	Productivitatea și conținutul de ulei
Semitardiv	Rezistență înaltă la iernare	Potențial de roadă excelent
Caracteristici agronomice	Înflorit târziu	Conținut ridicat de ulei
■ Se pretează pentru termenii de semănat medii și tardivi ■ Capacitate mare de ramificare ■ Înălțimea plantei - medie/înaltă	Rezistență excelentă la cădere	Conținutul în glucosinolați 17-18 mk mol/g
Caracteristici fenologice	Rezistență foarte bună la desfacerea și scuturarea silicvelor	Ritm rapid de creștere în toamnă
■ Ritm de creștere în toamnă - rapid ■ Ritm de creștere în primăvară - rapid ■ Începutul înfloritului - târziu	Potențial de producție excepțional	Ritm rapid de creștere în primăvară
	Adaptat la diferite condiții de agrofon	Toleranță foarte bună la fomoză RLM 7-3

Rezistență la			
Îngheț	TuYV	Sclerotinia	Fomoză
înaltă	medie	înaltă	înaltă (RLM 7-3)

Recomandări	
Termeni de însămânțare	Norma de semănat recomandată
începând cu decada a II a lunii august până în decada a II a lunii septembrie	400-500 mii/ha

KWS SAUROS CL

Rapiță de toamnă



NOU




- Hibrid cu potențial de producție foarte ridicat
- Rezistență genetică la Phoma Lingam asigurată de către Phoma Protect 2.0 (RLM7)
- Productivitatea este extrem de ridicată, întărită de buna comportare la scuturarea semințelor din silicve



Hibrizi stabili

Caracteristici agronomice superioare



Simplu, cea mai potrivită alegere!

Grupa de maturitate	Puncte forte	Productivitatea și conținutul de ulei
Semitardiv	-20 Rezistență înaltă la iernare	Potențial de roadă excelent
Caracteristici agronomice	Înflorit târziu	Conținut ridicat de ulei
■ Se pretează pentru termenii de semănat medii și tardivi	Rezistență excelentă la cădere	Conținutul în glucozinolați 17-18 mk mol/g
■ Capacitate mare de ramificare	Rezistență excelentă la desfacerea și scuturarea silicvelor	Ritm rapid de creștere în toamnă
■ Înălțimea plantei - medie/înaltă	Potențial de producție excepțional	Ritm lent de creștere în primăvară
Caracteristici fenologice	Adaptat la diferite condiții de agrofon	Toleranță foarte bună la fomoză RLM 7
■ Ritm de creștere în toamnă - rapid		
■ Ritm de creștere în primăvară - lent		
■ Începutul înfloritului - târziu		

Rezistență la			
Îngheț	TuYV	Sclerotinia	Fomoză
înaltă	medie	înaltă	înaltă RLM 7

Recomandări	
Termeni de însămânțare	Norma de semănat recomandată
începând cu decada a II a lunii august până în decada a II a lunii septembrie	400-500 mii/ha