

Cu un pas înainte.

Cu hibridii de rapiță și soluțiile KWS.

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ

UMBERTO KWS	39
KWS SANCHOS	40
KWS MIKADOS	41
KWS SAUROS CL	42

UMBERTO KWS

Rapiță de toamnă



- Potențial de producție excepțional
- Rezistență excelentă la cădere
- Tolerant la fomoză (RLM 3 și RLM 7)
- Rezistență foarte bună la scuturare
- Rezistență înaltă la iernare
- Capacitate foarte mare de ramificare
- Adaptat la semănatul tardiv

Grupa de maturitate

Semitimpuriu

Caracteristici agronomice

- Se pretează pentru termenii de semănat medii și târzi
- Capacitate mare de ramificare
- Înălțimea plantei - medie/înaltă

Caracteristici fenologice

- Ritm de creștere în toamnă - rapid
- Ritm de creștere în primăvară - rapid
- Începutul înfloritului - timpuriu

Puncte forte



Rezistență înaltă la iernare



Înflorit timpuriu



Rezistență excelentă la cădere



Rezistență foarte bună la desfacerea și scuturarea silicvelor



Potențial de producție excepțional

Adaptat la diferite condiții de agrofon

Productivitatea și conținutul de ulei



Potențial de roadă excelent



Conținut ridicat de ulei



Conținutul în glucozinolați 17-18 mk mol/g



Ritm rapid de creștere în toamnă



Ritm rapid de creștere în primăvară



Toleranță foarte bună la fomoză RLM 3 și RLM 7

Rezistență la

Îngheț

Alternarioză

Sclerotinia

Fomoză

înaltă

înaltă

medie

înaltă (RLM 3 și RLM 7)

Recomandări

Termeni de însămânțare

Norma de semănat recomandată

începând cu decada a II a lunii august până în decada a II a lunii septembrie

400-500 mii/ha