

# UMBERTO KWS

Rapiță de toamnă



NOU

- Potențial de producție excepțional
- Rezistență excelentă la cădere
- Tolerant la fmoză (RLM 3 și RLM 7)
- Rezistență foarte bună la scuturare
- Rezistență înaltă la iernare
- Capacitate foarte mare de ramificare
- Adaptat la semănatul tardiv

## Grupa de maturitate

Semitimpuriu

## Caracteristici agronomice

- Se pretează pentru termenii de semănat medii și târzi
- Capacitate mare de ramificare
- Înălțimea plantei - medie/înaltă

## Caracteristici fenologice

- Ritm de creștere în toamnă - rapid
- Ritm de creștere în primăvară - rapid
- Începutul înfloritului - timpuriu

## Puncte forte



Rezistență înaltă la iernare



Înflorit timpuriu



Rezistență excelentă la cădere



Rezistență foarte bună la desfacerea și scuturarea silicvelor



Potențial de producție excepțional

Adaptat la diferite condiții de agrofon

## Productivitatea și conținutul de ulei



Potențial de roadă excelent



Conținut ridicat de ulei



Conținutul în glucozinoлаți 17-18 mk mol/g



Ritm rapid de creștere în toamnă



Ritm rapid de creștere în primăvară



Toleranță foarte bună la fmoză RLM 3 și RLM 7

## Rezistență la

Îngheț

înaltă

Alternarioză

înaltă

Sclerotinia

medie

Fmoză

înaltă (RLM 3 și RLM 7)

## Recomandări

Termeni de însămânțare

începând cu decada a II a lunii august până în decada a II a lunii septembrie

Norma de semănat recomandată

400-500 mii/ha