

Hibrizii de floarea-soarelui KWS

SUVEX
ARNETES SU
FORTANES SU
KWS ADEMES SU
ARNOLDES CL HO

www.kws.md


FĂURIM VIITORUL
 DIN 1856




SUVEX

- Se cultivă în tehnologia ExpressSun
- Hibrid bine adaptat la diferite condiții de sol și climatice cu un echilibru optim al randamentului și al conținutului de ulei

Caracteristici fiziologice



Înălțimea plantei, cm **150-170**



Diametrul calatidiului, cm **18-22**



O bună rezistență la cădere și frângere



Toleranță înaltă la secetă



Uscare rapidă a calatidiilor la maturare

Densitatea plantelor recomandată la recoltare

La irigat, mii/hectar



La neirigat, mii/hectar



Grupa de maturitate


Semitimpuriu, linoleic

Caracteristici agronomice

- Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii)
- Rezistență la Lupoai până la rasa A-F

Recomandată pentru cultivarea în zonele de stepă și silvostepă

Conținutul de ulei



Potențial de producție

Semințe, t/ha



> 5



ARNETES SU

- Se cultivă în tehnologia ExpressSun
- Hibrid adaptat la condițiile de mediu întâlnite. Potențial excelent de producție.

FORTANES SU

- Se cultivă în tehnologia Expressun
- Potențial înalt de roadă
- Se adaptează foarte bine la condițiile secetoase, asigurând un randament stabil în condiții meteorologice nefavorabile.

NOU

Caracteristici fiziologice	Densitatea plantelor recomandată la recoltare	Conținutul de ulei
 Înălțimea plantei, cm160-180	La irigat, mii/hectar  La neirigat, mii/hectar 	 Diametrul calatidiului, cm18-22
 O bună rezistență la cădere și frângere	Grupa de maturitate Mijlociu, linoleic	 Diametrul calatidiului, cm18-20
 Toleranță înaltă la secetă	Potențial de producție Semințe, t/ha  > 5	Grupa de maturitate Semitimpuriu, linoleic
 Uscare rapidă a calatidiilor la maturare	Caracteristici agronomice ■ Toleranța avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii) ■ Rezistență la lupoai rasă A-F Recomandată pentru cultivarea în zonele de stepă și silvostepă	Caracteristici agronomice ■ Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii) ■ Rezistență la lupoai (Orobanche cumana) inclusiv rasă A-F ■ Toleranță foarte bună la secetă și arșiță. Recomandată pentru cultivarea în zonele de stepă și silvostepă

Caracteristici fiziologice	Densitatea plantelor recomandată la recoltare	Conținutul de ulei
 Înălțimea plantei, cm160-180	La irigat, mii/hectar  La neirigat, mii/hectar 	 Diametrul calatidiului, cm18-20
 O bună rezistență la cădere și frângere	Grupa de maturitate Semitimpuriu, linoleic	 Diametrul calatidiului, cm18-20
 Toleranță înaltă la secetă	Potențial de producție Semințe, t/ha  > 5	Grupa de maturitate Semitimpuriu, linoleic
 Uscare rapidă a calatidiilor la maturare	Caracteristici agronomice ■ Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii) ■ Rezistență la lupoai (Orobanche cumana) inclusiv rasă A-F ■ Toleranță foarte bună la secetă și arșiță. Recomandată pentru cultivarea în zonele de stepă și silvostepă	Caracteristici agronomice ■ Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii) ■ Rezistență la lupoai (Orobanche cumana) inclusiv rasă A-F ■ Toleranță foarte bună la secetă și arșiță. Recomandată pentru cultivarea în zonele de stepă și silvostepă



KWS ADEMES SU

- Se cultivă în tehnologia ExpressSun
- Hibrid din grupa de maturitate mijlocie, bine adaptat la diferite condiții climaterice, cu potențial de producție înalt.


NOU


ARNOLDES CL HO

- Se cultivă în tehnologia Clearfield
- Hibrid cu potențial de producție foarte ridicat, bogat în acid oleic (>85%)
- Toleranță avansată la boli(Phoma, Sclerotinia)

NOU



Caracteristici fiziologice	Densitatea plantelor recomandată la recoltare	Conținutul de ulei
 Înălțimea plantei, cm 160-180	La irigat, mii/hectar 	
 Diametrul calatidiului, cm 18-22	La neirigat, mii/hectar 	
 O bună rezistență la cădere și frângere	Grupa de maturitate Mijlociu, linoleic	Potențial de producție Semințe, t/ha
 Toleranță înaltă la secetă	Caracteristici agronomice ■ Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii) ■ Rezistență la lupoaie rasa A-F ■ Rezistență ridicată la mana florii-soarelui (RM9)	 > 5
 Uscare rapidă a calatidiilor la maturare	Recomandată pentru cultivarea în zonele de stepă și silvostepă	

Caracteristici fiziologice	Densitatea plantelor recomandată la recoltare	Conținutul de ulei
 Înălțimea plantei, cm 160-180	La irigat, mii/hectar 	
 Diametrul calatidiului, cm 18-20	La neirigat, mii/hectar 	
 O bună rezistență la cădere și frângere	Grupa de maturitate Semitardiv, high oleic	Potențial de producție Semințe, t/ha
 Toleranță înaltă la secetă	Caracteristici agronomice ■ Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii) ■ Rezistență la lupoaie rasa A-E ■ Rezistență la mană(RM9)	 > 5
 Uscare rapidă a calatidiilor la maturare	Recomandată pentru cultivarea în zonele de stepă și silvostepă	