

CUBUS

SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856



Robust höstvetete för senare sådd

CUBUS		
Avkastning, rel svampbehandlade försök		
område A-B	2018	101
område A-B (2014-2018)		98
område D-F (2014-2018)		95
Sjukdomar, angrepp % (obehandlade försök)		
mjöldagg		3 (56*)
brunrost		4 (82*)
gulrost		1 (36*)
svartpricksjuka		15 (196*)
bladfläcksjuka (DTR)		8 (102*)
resistens röd vetemygga		NEJ
Agronomi och kvalitet (svampbehandlade försök)		
bestånd vår, %		90 (96*)
stråstyrka, 0-100		73 (83*)
strållängd, cm		80 (98*)
mognad, dagar efter sådd		310 (99*)
proteinhalt, %		11,2 (102*)
rymdvikt, g/l		825 (102*)
falltal, sekunder		374 (108*)

Källa: SLU Växtproduktionsekologi

- Cubus är sorten som det skördemässigt verkligen går att lita på, år ut år in
- Lämpad för sådd från normal såtidpunkt till sen, undvik de tidigaste sådderna
- Avkastningen sitter helt i den fantastiska förmågan att fylla axet med kärnor.

Cubus är en mycket robust höstvetesort som lämnat högst avkastning i de södra delarna av Sverige.

Sorten är särskilt lämpad för sen sådd, men kan utan problem sås från normal såtidpunkt.

Utsädesmängden bör inte överdrivas, även vid senare sådd, för minskad belastning av strået.

Anpassningsförmåga till årsmån och odlingslokal är mycket stor. Svartpricksjuka skall hållas under uppsikt och vid behov kontrolleras i DC 39 – 43 (flaggblad helt framme).

JULIUS

SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856



Sveriges säkraste höstvete

JULIUS		
Avkastning, rel svampbehandlade försök		
område A-B	2018	98
område A-B	(2014-2018)	99
område D-F	(2014-2018)	99
Sjukdomar, angrepp % (obehandlade försök)		
mjöldagg	5	(94*)
brunrost	2	(34*)
gulrost	3	(151*)
svartpricksjuka	7	(88*)
bladfläcksjuka (DTR)	7	(95*)
resistens röd vetemygga		NEJ
Agronomi och kvalitet (svampbehandlade försök)		
bestånd vår, %	94	(100*)
stråstyrka, 0-100	88	(100*)
strållängd, cm	85	(105*)
mognad, dagar efter sådd	314	(100*)
proteinhalt, %	11,4	(104*)
rymdvikt, g/l	827	(102*)
falltal, sekunder	354	(102*)

*) anger relativtalet för respektive egenskap

Källa: SLU Växtproduktionsekologi

- Julius, det säkra höstvetet, när det gäller avkastning, brödkvalitet och övervintring
- Lämpad för tidig till sen sådd, säkerställt av den omvitnat utmärkta vinterhärdigheten
- Avkastningen kommer ur en jämförelsevis hög tusenkorn-vikt, odlingsåtgärder för säkra denna betalar sig väl.

Julius är sorten som är anpassad för odling över hela det höstvet-eodlande Sverige.

Sorten har efterhand blivit en standard hos kvarnindustrin = alltid säker avsättning.

Sorten kan sås genom hela höstsådden, risken för ”förväxning” på hösten är liten, varför den utan problem kan sås tidigt.

Kvävegivan kan med fördel betonas senare stadier: 20% + 50% + 30%.

Mottagligheten för sjukdomar är under medel, men senare års nya gulrostraser kan angripa och skall därför bevakas.

KWS AHOI

SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856



När tidighet och kvalitet är viktig

NYHET

KWS AHOI		
Avkastning, rel svampbehandlade försök		
område A-B	2018	100
område A-B	(2014-2018)	100
område D-F	(2014-2018)	97
Sjukdomar, angrepp % (obehandlade försök)		
mjöldagg	2	(37*)
brunrost	5	(91*)
gulrost	4	(174*)
svartpricksjuka	7	(99*)
bladfläcksjuka (DTR)	9	(118*)
resistens röd vetemygga		NEJ
Agronomi och kvalitet (svampbehandlade försök)		
bestånd vår, %	96	(100*)
stråstyrka, 0-100	75	(85*)
strållängd, cm	79	(98*)
mognad, dagar efter sådd	311	(99*)
proteinhalt, %	11,2	(102*)
rymdvikt, g/l	826	(102*)
falltal, sekunder	370	(107*)

*) anger relativtalet för respektive egenskap

Källa: SLU Växtproduktionsekologi

- KWS Ahoi är en ny tidig höstvetesort utmärkt som förfrukt till höstoljeväxter
- KWS Ahoi besitter kvalitetsegenskaper som säkrar avsättningen som brödvete
- Vinterhärdigheten i KWS Ahoi är betryggande och gör sorten lämplig för odling över hela Sverige.

KWS Ahoi är en ny, tidig höstvetesort för kvarnbruk som introduceras hösten 2019.

Sorten har lämnat en något högre avkastning i den södra landsändan men vinterhärdigheten är betryggande varför odling rekommenderas över hela Sverige.

Sortens kvalitet säkrar avsättningen till kvarn. Kvävegivan kan med fördel betonas i senare stadier: 20% + 50% + 30% vid 3-delad giva.

Sjukdomsmottagligheten är måttlig, men senare års nya gulrostraser kan angripa och skall därför bevakas.

KWS KERRIN

SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856



Marknadens högsta avkastning

NYHET

KWS KERRIN		
Avkastning, rel svampbehandlade försök		
område A-B	2018	106
område A-B	(2014-2018)	107
område D-F	(2014-2018)	106
Sjukdomar, angrepp % (obehandlade försök)		
mjöldagg	3	(59*)
brunrost	0	(-)
gulrost	3	(166*)
svartpricksjuka	9	(123*)
bladfläcksjuka (DTR)	7	(97*)
resistens röd vetemygga		JA
Agronomi och kvalitet (svampbehandlade försök)		
bestånd vår, %	96	(100*)
stråstyrka, 0-100	87	(99*)
strå längd, cm	76	(94*)
mognad, dagar efter sådd	314	(100*)
proteinhalt, %	9,8	(89*)
rymdvikt, g/l	72	(102*)
falltal, sekunder	789	(97*)

*) anger relativtalet för respektive egenskap

Källa: SLU Växtproduktionsekologi

- KWS Kerrin är en ny mycket högt avkastande höstvetesort för industri- och foderbruk som introduceras 2019
- Vinterhårdigheten i KWS Kerrin är trots ursprunget från Storbritannien god, vilket gör sorten lämplig för hela Sverige
- Sortens agronomiska egenskaper medger även intensivare odlingsformer.

Ny, mycket högt avkastande höstvete för industri- och foderändamål med toppavkastning i hela Sverige.

Kort strå med ringa tendens till liggsädesbildning kombineras med en relativt tidig avmognad.

Svartpricksjuka skall hållas under uppsikt och vid behov kontrolleras i DC 39-43 (flaggblad framme).

Erfarenheter från Storbritannien tyder på att sorten klarar sig bra som andra-årsvete.

Sorten är resistent mot röd vetemygga.